



Więcej informacji na stronie:
www.rowne.wzp.pl



Fundusze Europejskie
dla Pomorza Zachodniego



Rzeczpospolita Polska




Dofinansowane przez
Unię Europejską

PO RÓWNO CZY SPRAWIEDLIWIE?

Równość rozumiana jako identyczne
traktowanie nie zawsze prowadzi do
sprawiedliwości

RÓWNOŚĆ PŁAC

Zastanawiając się nad traktowaniem kobiet i mężczyzn „po równo”, możemy rozpocząć od kwestii równej płacy – to stosunkowo łatwe do zmierzenia i porównania. Dane pokazują, że kobiety zatrudnione w zawodach zdominowanych przez mężczyzn **zarabiają średnio nawet o 20% mniej**, mimo wykonywania tej samej pracy i zajmowania tych samych stanowisk.



KTO ZAJMUJE SIĘ NAUKĄ?

Od ponad 50 lat prowadzi się badanie, w którym dzieci w wieku 5-12 lat proszone są o narysowanie osoby zajmującej się nauką. Przez dekady **większość rysunków przedstawiała osoby płci męskiej** w fartuchach laboratoryjnych. W pierwszych badaniach (1966-1977) na 5 000 rysunków tylko 28 pokazywało kobiety – wszystkie narysowane przez dziewczynki.




Z czasem ten obraz się zmienia. W 1985 roku 33% dziewczynek rysowało naukowczynie, a w 2016 roku już 58%. **Chłopcy nadal w większości przypadków rysują mężczyzn.**

Wyniki badania pokazują, jak silnie stereotypy wpływają na nasze wyobrażenia o rolach społecznych – i jak długo utrzymują się nawet wtedy, gdy rzeczywistość się zmienia.

MEDYCYNĄ

Podobny mechanizm widoczny jest w medycynie. Przez wiele lat **badania kliniczne i testy leków prowadzone były głównie z udziałem mężczyzn**, a wyniki uogólniano na całą populację. Badaczki i badacze wskazują, że kobiety rzadziej uczestniczą w badaniach klinicznych m.in. z powodu większego obciążenia obowiązkami opiekuńczymi, które utrudniają regularne wizyty kontrolne. Konsekwencją niedostatecznej reprezentacji kobiet w badaniach jest mniejsza wiedza na temat działania wielu leków w kobiecych organizmach oraz większe ryzyko działań niepożądanych.



Przykładowe różnice w objawach zawału serca

Podobnie wygląda kwestia popularyzacji wiedzy o zawałach serca. Przez lata w przestrzeni publicznej utrzymywał się obraz typowych objawów – takich jak silny ucisk w klatce piersiowej czy ból promieniujący do lewej ręki. Tymczasem **u wielu kobiet objawy mogą być inne** i obejmować m.in. osłabienie, nudności, wymioty, ból szyi, pleców czy podbrzusza. Rzadziej rozpoznawane symptomy mogą prowadzić do opóźnionej diagnozy.